Hebestola candicans nov. sp.

Gracilis, rufo-ferruginea, antennis pedibusque dilutioribus, pube albida haud dense vestita: caput inter antennas concavum, subtiliter punctulatum, tuberibus antenniferis magnis, elevatis, fronte trapezoïdali, oculorum lobis inferioribus subelongatis, genis brevibus: antennæ ♀ corpore vix longiores, subtus laxe ciliatæ, scapo gradatim leniter clavato, fossulis haud notato, art. 4 præcedente nec non et sequente multo longiore; thorax latitudine haud longior, subcylindricus, lateraliter ante medium spina parva paulo erecta utrinque armatus, subtiliter crebre punctatus; scutellum semi-rotundum, dense albido-pubescens; elytra elongata, parallela, apice obliquiter breviterque subtruncata, angulis suturalibus rotundatis, externis brevissime productis, dorso paulo deplanata, punctis postice obsolescentibus irregulariter haud dense cribrata setisque brevibus, albidis, ordinatis, sparsim hirsuta; coxæ anticæ globosæ, processu prosternali angusto perparum separatæ; mesosterni processus paulo latior, cuneatus, postice obtusus; acetabula media extus clausa; femora brevia, gradatim leniter clavata, postica abdomine multo breviora; tibiæ mediæ extus obsolete sulcatæ; tarsi appendiculati: tarsorum posticorum art. 1, 2° et 3° simul sumptis æqualis; corpus subtus punctis dispersis impressum; abdominis segmentum ultimum ♀ apice subemarginatum depressioneque semi-rotunda notatum. — Long., 8.7 millim.

Pinullar (alt., 2.900 m.), Équateur 1903. — 1 ex. ♀.

Coléoptères : Pédilides et Anthicides recueillis au Japon, par MM. J. Harmand et E. Gallois [*Col.*],

par M. Maurice Pic, Correspondant du Muséum.

Les chasses faites par MM. E. Gallois et J. Harmand et envoyées au Laboratoire d'Entomologie du Muséum, bien qu'elles ne nous offrent qu'une espèce nouvelle, comprennent un certain nombre d'anciennes espèces plus ou moins rares, notamment des *Anticomorphus* Lewis, et par cela offrent beaucoup d'intérêt. Voici l'énumération de ces récoltes entomologiques :

Eurygenius niponicus Lewis. Environs de Tokio (J. Harmand); Kiou Siou ou Kiushiu (E. Gallois).

Stereopalpus gigas Marseul. Tamura près Hiratsuka (E. Gallois).

Macratria fluviatilis Lewis. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Harmand).

Macratria japonica Harold. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Harmand).

MECYNOTARSUS? TENUIPES Champ. Yukiai. Sous les feuilles au bord de la mer (E. Gallois).

MECYNOTARSUS MINIMUS Marseul. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Harmand).

FORMICOMUS BRAHMINUS Laferté et variété. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Harmand).

ANTHICOMORPHUS SUTURALIS Lewis. Environs de Tokio (J. Harmand); Kumanotaïra près Karnijawa (E. Gallois).

ANTHICOMORPHUS CRURALIS Lewis. Kiou Siou (E. Gallois).

ANTHICOMORPHUS NIPONICUS Lewis. Environs de Tokio (J. Harmand).

PSEUDOLEPTALEUS TRIGIBBER Marseul. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Harmand).

ANTHICUS CONFUCII Marseul et variétés. (Chez cette espèce, les bandes brunes des élytres sont plus ou moins élargies, parfois peu distinctes.) Environs de Tokio (E. Gallois et J. Harmand); Omiya (E. Gallois).

ANTHICUS VALGIPES Marseul. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Harmand).

ANTHICUS MARSEULI Pic. (SCOTICUS Mars.) et variété. (Environs de Tokio, Kiou Siou (E. Gallois et J. Harmand).

ANTHICUS COHOERES Lewis. (Semble être une variété de *Marseuli* Pic. à coloration foncée de l'avant-corps, plutôt qu'une espèce propre.) Tokio et environs (E. Gallois et J. Harmand); Kumanotaïra (E. Gallois)-

Anthicus Galloisi nov. sp.

Satis elongatus, parum convexus, nitidissimus, sparse et longe griseo pilosus, niger, elytris rubris, nigro-maculatis, antennis pedibusque nigris.

Assez allongé, peu convexe, très brillant, orné de poils gris longs et épars avec quelques autres obscurs dressés, noir, élytres rougeâtres maculés de noir, ces macules à reflets bleuâtres, membres foncés. Tête noire, courte et large, subtronquée postérieurement; antennes noires, assez courtes, grêles, un peu épaissies à l'extrémité; prothorax noir, plus long que large, peu élargi en avant, sinué latéralement, à ponctuation très forte, plus ou moins espacée; élytres bien plus larges que le prothorax, subparallèles, un peu rétrécis postérieurement, à ponctuation espacée forte, s'affaiblissant en arrière, de coloration générale rougeâtre, avec la base et le sommet plus largement noirs, enfin une grande macule subtransversale médiane externe, qui n'atteint pas la suture, celle-ci également noire à reflets bleuâtres; pattes grêles, noires, avec les tarses un peu rembrunis. Longueur, 5 millimètres.

Nippon moyen : Tokio 16-7-1907 (E. Gallois).

Je ne connais pas *A. extus* Lewis, si ce n'est par sa description, mais je ne pense pas que *A. Galloisi* n'en soit qu'une variété à coloration claire plus étendue sur les élytres.

A. Galloisi ressemble à *A. cohæres* Lewis, mais son protherax et ses élytres sont plus fortement ponctués, les antennes sont entièrement foncées (chez *cohæres*, les antennes sont plus au moins testacées ou roussâtres à leur extrémité); enfin le dessin élytral est différent.

Anthicus fugiens Marseul. Environs de Tokio (E. Gallois et J. Harmand); Kiou Siou, Mont Takao près Hachiozi (E. Gallois).

Anthicus laevipennis Marseul. Environs de Tokio (J. Harmand).

Coléoptères : Hylophilides nouveaux originaires d'Abyssinie et du Japon [Col.],

par M. Maurice Pic, Correspondant du Muséum.

Les cinq espèces d'Hylophilus qui suivent font partie des collections entomologiques du Muséum de Paris et *H. Rogeri* figure aussi dans ma collection; la première a été recueillie en 1903 en Abyssinie par le Dr J. Roger: les autres ont été capturées au Japon dans le courant de 1906, par MM. E. Gallois et J. Harmand. Je suis heureux de dédier trois de ces espèces aux zélés chasseurs qui les ont recueillies.

Hylophilus Rogeri nov. sp.

Satis elongatus, nitidus, griseo pruinoso pubescens, pro parte niger, pro parte rubro-testaceus, elytris ad basin rubro maculatis, antennis pedibusque pro majore parte testaceis.

Assez allongé, brillant, revêtu d'une pubescence pruineuse grise couchée, en partie noir, en partie testacé-rougeâtre, avec une macule de cette dernière coloration sur la base des élytres, membres presque entièrement testacés. Tête noire, densément ponctuée, large, tronquée postérieurement: yeux gros, assez rapprochés sur le front et touchant presque le bord postérieur de la tête; antennes testacées, longues et assez grêles, subfiliformes, à 2e article un peu plus court que 3e; prothorax testacé, plus ou moins noir sur son milieu en dessus, densément ponctué, long, subparallèle sur les côtés, sinué postérieurement avec une dépression médiane; élytres noirs à base testacée-rougeâtre, finement ponctués surtout postérieurement, bien plus larges que le prothorax, assez longs, subparallèles puis rétrécis postérieurement, à dépression antérieure nette; dessous du corps testacé avec l'abdomen plus ou moins foncé; pattes testacées avec les cuisses postérieures au moins plus ou moins obscurcies ou rembrunies, grêles; tibias antérieurs et postérieurs denticulés en dedans.

Longueur, 3 millimètres.